



Patientenkarte

Patientenkarte Topiramate – für Frauen und Mädchen, die schwanger werden können

Empfängnis- und Schwangerschaftsverhütung

Was Sie wissen müssen

- Topiramate ist ein Arzneimittel zur Behandlung von Epilepsie und Migränekopfschmerzen.
- Topiramate kann ein ungeborenes Kind ernsthaft schädigen, wenn es während der Schwangerschaft eingenommen wird.

Was Sie tun müssen

- Lesen Sie die Packungsbeilage und den Patientenleitfaden vor der Einnahme sorgfältig durch.
- Sie müssen während der Behandlung mit Topiramate und mindestens 4 Wochen nach der letzten Topiramate-Einnahme eine hochwirksame Verhütungsmethode anwenden. Ihr Arzt wird Sie über die für Sie am besten geeignete Verhütungsmethode beraten.
- Suchen Sie Ihren Arzt mindestens einmal im Jahr auf, um Ihre Behandlung zu überprüfen.
- Wenn Sie glauben, schwanger zu sein, sprechen Sie sofort mit Ihrem Arzt.
- Wenn Sie darüber nachdenken, ein Kind zu bekommen, setzen Sie die Empfängnisverhütung nicht ab, bevor Sie mit Ihrem Arzt gesprochen haben.
- Wenn Sie Epilepsie haben, setzen Sie Topiramate nur dann ab, wenn Ihr Arzt Sie dazu auffordert, da sich sonst Ihr Zustand verschlechtern kann.

Fragen Sie Ihren Arzt nach dem Patientenleitfaden.

Bewahren Sie diese Karte auf.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in diesem Leitfaden die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keinerlei Wertung.